

在胎28週未満の呼吸管理について


出生前ステロイド投与についての方針をお答えください。

15件の回答




肺サーファクタント投与方針についてお答えください

15件の回答




人工呼吸管理をする場合に急性期は (S) IMVですか、それともHFOですか？

15件の回答



抜管時期の設定についてもっとも近いのはどれですか？

15件の回答




BPD(慢性肺疾患)の対応について①

急性期を過ぎた後のTarget

SpO2はそのときの週数によって変えていますか？


15件の回答



Target SpO2を変えていない場合の


Target SpO2は次のうちどれですか？

2件の回答




Target SpO2を変えている場合の
何週でTarget SpO2を変えていますか？

12件の回答




Target SpO2を変えている場合の
初めに設定するTarget SpO2は次のうちどれですか？

13件の回答




Target SpO2を変えている場合の
後半で設定するTarget SpO2は次のうちどれですか？

13件の回答




急性期を過ぎたあとの人工呼吸管理は主にSIMV（PS・ACを含む）ですか？HFOですか？


15件の回答



急性期を過ぎたあとのSIMV（PS・AC含む）管理の際にSpO2が上がりにくくなり、FiO2が上昇傾向にあるときに、PEEPはどこまで上げますか？




急性期を過ぎたあとのHFO管理の際にSpO2が上がりにくくなり、FiO2が上昇傾向にあるときに、MAPはどこまで上げますか？




BPDに対して吸入ステロイドを使うことがありますか？

15件の回答




BPDに対して全身ステロイド投与を行うことがありますか？

15件の回答




全身ステロイド投与には何を使いますか？

14件の回答




BPDの重症度の評価のために受胎後36週でoxygen reduction testをしていますか？

15件の回答



BPDに合併する肺高血圧を評価するために心エコー検査をしていますか？

15件の回答




心エコーの対象はどのように選んでいますか？

中等症以上のBPDあるいは肺高血圧を疑わせる症状あり
 慢性肺疾患のある児
 全患者
 呼吸循環障害
 BPDと診断したVLBWI, ELBWI
 主治医判断
 在宅酸素療法が予想される児全員、酸素不要となった重症CLDの児に対して検査をしています。
 肺高血圧発作の既往や酸素必要量の急な増加など
 修正36週以降に酸素需要のある児
 症状をみて
 重症BPDの症例（36週で酸素投与などあり）
 1500g以下
 酸素需要が大きい児/長期にわたる児
 退院前の極低出生体重児、抜管後も酸素投与が必要な児
 修正36週で酸素依存性のある児


心エコーは主に誰がしていますか？

15件の回答



心エコーを評価する時期は決めていますか？

15件の回答



心エコーで評価する項目はどれですか？ すべて選択してください

