

ナシマルカイガラムシ情報第1号

平成27年5月15日
愛知県農業総合試験場
環境基盤研究部病害虫防除室

**防除適期は、5月26日から6月2日です！
防除適期を逃さないように注意しましょう。**

1 ナシマルカイガラムシの防除適期

雌成虫（図(左)）、卵、2齢幼虫は介殼（カイガラ）で覆われ薬液がかかりにくいいため、その時期に農薬散布しても効果はほとんど期待できません。農薬による防除効果が高いのは、ふ化後に介殼からはい出してくる1齢幼虫（図(右)）です。特に、第1世代1齢幼虫の発生時期はそろっているうえ、葉もあまり繁茂していないので、農薬の散布むらが生じにくく、第1世代1齢幼虫の発生ピークは最も有効な防除時期です。

発生ピークは3月から5月の気温により変動しますので、毎年、有効積算温度による防除適期予測に基づいて防除することが重要です。




図 ナシマルカイガラムシの雄幼虫と雌成虫（左）、1齢幼虫（右）

2 防除適期予測

有効積算温度を利用したナシマルカイガラムシ第1世代1齢幼虫の発生ピーク予測日は、前年より早く、5月26日から6月2日です（表）。

表 ナシマルカイガラムシの第1世代1齢幼虫発生ピーク予測日

| | 愛西 | 南知多 | 名古屋 | 豊田 | 岡崎 | 蒲郡 | 新城 | 豊橋 | 伊良湖 |
|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|
| 本年 | 5/30 | 6/1 | 5/26 | 5/26 | 5/31 | 5/28 | 6/2 | 5/30 | 5/30 |
| 前年 | 6/1 | 6/2 | 5/29 | 5/30 | 6/3 | 6/1 | 6/5 | 6/2 | 6/2 |
| 前年差 | 2日早 | 1日早 | 3日早 | 4日早 | 3日早 | 4日早 | 3日早 | 3日早 | 3日早 |

アメダス平均気温から予測。5月14日までは本年実測値を、それ以降は平年値（豊橋は前年値）を用いて計算。前年は、前年気温の実測値を用いて計算。

3 防除

- (1) 第1世代1齢幼虫発生ピーク予測日を参考に、アプロードフロアブルやスプラサイド水和剤、モスピラン顆粒水溶剤などで防除しましょう。
- (2) 雌成虫が重なり合って寄生している場合は、薬液が1齢幼虫の虫体にかかりにくいので、雌成虫を削り取ってから農薬を散布しましょう。
- (3) 農薬の散布むらがないように十分な薬液量を丁寧に散布しましょう。