

エイズ患者・HIV感染者の状況

1 日本の状況(2024年12月31日現在)

(1) 感染原因・男女別 累積患者・感染者報告数(凝固因子製剤が原因と推定されるものを除く、()内は外国人の再掲)

感染原因	患者数						感染者数						合計	
	男性		女性		小計		男性		女性		小計			
異性間性的接触	2,895	(348)	553	(256)	3,448	(604)	4,066	(564)	1,826	(930)	5,892	(1,494)	9,340	(2,098)
同性間性的接触※1	4,868	(293)	5	(2)	4,873	(295)	15,549	(1,269)	5	(1)	15,554	(1,270)	20,427	(1,565)
静注薬物濫用者	64	(30)	7	(3)	71	(33)	79	(31)	7	(5)	86	(36)	157	(69)
母子感染	11	(1)	9	(6)	20	(7)	27	(9)	19	(9)	46	(18)	66	(25)
その他※2	384	(49)	46	(19)	430	(68)	658	(128)	78	(36)	736	(164)	1,166	(232)
不明	2,030	(489)	309	(187)	2,339	(676)	2,144	(556)	736	(591)	2,880	(1,147)	5,219	(1,823)
小計	10,252	(1,210)	929	(473)	11,181	(1,683)	22,523	(2,557)	2,671	(1,572)	25,194	(4,129)	36,375	(5,812)

(2) 感染原因別 患者・感染者報告数の年次推移(凝固因子製剤が原因と推定されるものを除く)

感染原因		1985-2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	合計	
患者	異性間性的接触	1,560	140	154	147	132	127	124	114	116	120	95	114	99	89	56	57	53	53	44	54	3,448	
	同性間性的接触※1	984	164	157	189	210	230	262	238	273	258	250	241	226	205	180	190	162	127	157	170	4,873	
	静注薬物濫用者	28	3	3	5	3	4	1	3	3	4	3	1	1	2	1	3	1	1		1	71	
	母子感染	17									1			1		1							20
	その他※2	95	15	29	13	15	17	15	8	14	11	6	16	22	11	24	20	30	14	26	29	430	
	不明	960	84	75	77	71	91	71	84	78	61	74	65	64	70	71	75	69	57	64	78	2,339	
患者計	3,644	406	418	431	431	469	473	447	484	455	428	437	413	377	333	345	315	252	291	332	11,181		
感染者	異性間性的接触	2,773	223	221	220	210	195	206	180	194	179	196	170	149	157	136	96	91	100	90	106	5,892	
	同性間性的接触※1	3,123	604	729	779	694	744	722	724	780	789	691	735	709	670	651	543	531	443	476	417	15,554	
	静注薬物濫用者	37	4	3	5	5	3	4	5	2	3	2	1	3		2	5			2		86	
	母子感染	31	1				3	1		1	1	1		3	1		1	1	1			46	
	その他※2	140	40	25	29	34	38	32	18	23	24	21	23	22	24	38	34	41	32	43	55	736	
	不明	1,288	80	104	93	78	92	91	75	106	95	95	82	90	88	76	71	78	56	58	84	2,880	
感染者計	7,392	952	1,082	1,126	1,021	1,075	1,056	1,002	1,106	1,091	1,006	1,011	976	940	903	750	742	632	669	662	25,194		
合計	9,871	1,358	1,500	1,557	1,452	1,544	1,529	1,449	1,590	1,546	1,434	1,448	1,389	1,317	1,236	1,095	1,057	884	960	994	36,375		

注: ※1 両性間性的接触を含む。 ※2 輸血等に伴う感染や複数の感染経路を含む。

(3) 凝固因子製剤が原因と推定される患者・感染者報告数

男性	1,422名
女性	18名
合計	1,440名

注: 「血液凝固異常症全国調査」による2022年5月31日現在の凝固因子製剤による感染者数

(4) 死亡者数

感染症法施行後の任意報告数(1999年4月1日～2023年12月31日)	494名
エイズ予防法に基づく法定報告数(1989年2月17日～1999年3月31日)	596名
凝固因子製剤による感染者の累積死亡者数	745名
合計	1,835名